

PUNCIONES

- **PUNCION HISTOLOGICA DE MAMA/ PUNCION HISTOLOGICA DE MAMA CON ARPON/ PUNCION HISTOLOGICA DE MAMA CON COLOCACIÓN DE CLIP/ PUNCION HISTOLOGICA DE MAMA DOBLE/ PUNCION CITOLOGICA DE MAMA/ PUNCION HISTOLOGICA DE GANGLIO AXILAR:**

Se solicita al paciente:

- no tomar aspirina ni aspirineta por lo menos 7 días antes de la punción.
- traer los resultados del análisis de coagulación 48 -72 horas antes del turno.
- traer estudios anteriores (si fueron realizados en otra institución)
- un corpiño deportivo.
- 2 pack de gel (medio suero que viene generalmente con las vacunas) bien congelados.
- no venir en ayunas.

- **PUNCION CITOLOGICA TIROIDEA/ PUNCION CITOLOGICA TIROIDEA DOBLE/ PUNCION CITOLOGICA TIROIDEA TRIPLE:**

Se solicita al paciente:

- no tomar aspirina ni aspirineta por lo menos 7 días antes de la punción
- traer los resultados del análisis de coagulación 48 -72 horas antes del turno.
- traer estudios anteriores (si fueron realizados en otra institución)
- no venir en ayunas.

- **PUNCION BIOPSIA DE PROSTATA POR 12 MUESTRAS/ PUNCION MULTIBIOPSIA PROSTATICA:**

Se solicita al paciente:

- no tomar aspirina ni aspirineta por lo menos 7 días antes de la punción.
- traer los resultados del análisis de coagulación 48 -72 horas antes del turno.
- traer estudios anteriores (si fueron realizados en otra institución)
- venir acompañado.

Día previo a la punción:

- dieta liviana.
- 1 comprimido de Ciprofloxacina x 500mg a las 11horas y repite a las 23 horas.

 0341 4255260 . 4490053

 info@sylabus.com.ar

 [sylabus.rosario](https://www.facebook.com/sylabus.rosario)



Sylabus

- 1 comprimido de Flagil x 500mg a las 8 horas, 16 horas y 00 horas.
- 1 microenema a las 00 horas.

Día de la punción:

- ayuno total, tanto de alimentos como de medicamentos (se recomienda tomar los medicamentos luego de realizada la punción).
- 3 horas antes de la punción el segundo microenema.
- 2 horas antes de la punción tomar 1 tranquilizante sublingual.
- ½ hora antes de la punción tomar 1 tranquilizante sublingual.
- traer el Acantex para que se lo coloque el doctor después de la punción.

Día posterior a la punción:

- continuar con la Ciprofloxacina x 500mg a las 11 horas y a las 23 horas por 5 días en total.
- continuar con el Flagil x 500mg a las 8 horas, 16 horas y 00 horas por 5 días en total.

 0341 4255260 . 4490053

 info@sylabus.com.ar

 [sylabus.rosario](https://www.facebook.com/sylabus.rosario)

